

FICHA TÉCNICA

AGRO FERT^YMAS

FERTIVYT POTASIO

FERTILIZANTE INORGÁNICO ENRIQUECIDO CON BORO Y MOLIBDENO

COMPOSICIÓN:

PARÁMETRO	% p/p	% p/v
Fosforo (P2O5)	24.01	31.21
Fosfito (PO3)	27.06	35.17
Potasio	12.69	16.48
Boro	0.25	0.32
Molibdeno	0.015	0.0195
Aspecto	Líquido transparente	

Complejado con ácidos carboxílicos.

CARACTERÍSTICAS:

Es una formulación Fósforo y Potasio líquida para optimizar la floración y cuajado de los frutos. El producto es fácilmente absorbido y distribuido por la planta.

Influye también en la:

- Potencia el sistema natural de defensas de las plantas.
- Optimiza floración.
- Corrección de estados carenciales asociados a bajos niveles de potasio.
- Resistencia de los cultivos a situaciones de estrés a frío y a relaciones de humedad sub óptimas (encharcamiento y punto de marchitez).



FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA Y FRECUENCIA DE APLICACION
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
ROSAS (<i>Rosa s.p.</i>)	1 a 1,5 cc/lit**	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
TOMATE RIÑON (<i>Solanum lycopersicum</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
FRESA (<i>Fragaria s.p.</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
MANGO (<i>Mangifera indica</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
PITAHAYA (<i>Hylocereus undatus</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
LIMON (<i>Citrus sp.</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
PLATANO – VERDE (<i>Musa paradisiaca</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días
CACAO (<i>Theobroma cacao</i>)	2.5 a 5 cc/lit*	Inicio de Pre-floración y Floración	Foliar, Fertirriego Cada 15 días

Volumen de agua: *400lt/ha; **1760lt/ha

“La información presente sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”

Incompatibilidad: El producto es incompatible con productos que poseen reacción alcalina (agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes). De todas maneras, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

